



Calendário de Vacinação do Adolescente

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
De 11 a 19 anos (na primeira visita ao serviço de saúde) (1)	Hepatite B (2)	1ª dose	Contra Hepatite B
	dT (Dupla tipo adulto) (3)	1ª dose	Contra Difteria e Tétano
	Febre amarela (4)	reforço	Contra Febre Amarela
	SCR (Tríplice viral) (5)	dose única	Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola
1 mês após a 1ª dose contra Hepatite B	Hepatite B	2ª dose	Contra Hepatite B
6 meses após a 1ª dose contra Hepatite B	Hepatite B	3ª dose	Contra Hepatite B
2 meses após a 1ª dose contra Difteria e Tétano	dT (Dupla tipo adulto)	2ª dose	Contra Difteria e Tétano
4 meses após a 1ª dose contra Difteria e Tétano	dT (Dupla tipo adulto)	3ª dose	Contra Difteria e Tétano
A cada 10 anos, por toda a vida	dT (Dupla tipo adulto) (6)	reforço	Contra Difteria e Tétano
	Febre amarela	reforço	Contra Febre Amarela

(1) Sem comprovação de vacina anterior, apresentar documentação com esquema incompleto e completar o já iniciado.

(2) **Hepatite B:** a 1ª dose da vacina deve ser feita no primeiro contato com o serviço de saúde. São 3 doses, com intervalo de 30 dias da 1ª para a 2ª e de 180 dias (6 meses) da 1ª para a 3ª dose.

(3) Se já recebeu 3 doses ou mais das vacinas **DTP, DT** ou **dT**, deve aplicar uma dose de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar para 5 anos após a última dose. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(4) **Febre Amarela:** se reside ou for viajar para as áreas com recomendação da vacina (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO, MG e DF e alguns municípios dos estados: PI, BA, SP, PR, SC e RS). Recomenda-se vacinar 10 dias antes da viagem e reforço a cada 10 anos. O ES, deixou de ser área de risco potencial de acordo com as novas recomendações do MS/2008/2009 por não apresentar evidência de circulação do vírus por 5 anos.

(5) Todo adolescente deve receber ou ter recebido duas doses da vacina tríplice viral ou dupla viral. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. Aqueles que tiverem as duas doses comprovadas, não precisam ser vacinados. Preferencialmente os adolescentes devem receber a vacina tríplice viral.

(6) **dT:** adolescente grávida, que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para cinco anos após a última dose.